



מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה  
מסונף לפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בגליל  
The BARUCH PADEH Medical Center, Poriya  
Affiliated to The Faculty of Medicine in Galilee - Bar Ilan University



Organization Accredited  
by Joint Commission International

**قسم العيون**

مديرة القسم:

د. حنين جبالي-حبيب

هاتف عيادة العيون – 04-6652226

فاكس لحجز أدوار - 04-6652748

## **ניתוח ויטרקטומי** **جراحة استئصال جل الزجاجية**

من خلال هذه الجراحة يتم استئصال جل الزجاجية. يتم القيام بالجراحة تحت تخدير موضعي أو جهازي، حسب مدة الجراحة ورغبة المتعالج. من خلال الجراحة يتم عمل فتحات صغيرة في جدار العين، ومن خلالها يدخل الجراح أدوات الجراحة. هناك عدة حالات تستوجب إجراء هذا النوع من الجراحات: علاج ثقب بقعي، استئصال غشاء من الشبكية، نزيف من الزجاجية أو انفصال الشبكية.

في الجزء الأول من الجراحة يتم القيام باستئصال لجل الزجاجية واستبداله بسائل صافي يلائم الأداء والحفاظ على العين. في حال يتم القيام بالجراحة لتصحيح انفصال الشبكية، خلال الجراحة سوف يتم الصاق الشبكية بجدار العين. سوف يتم شفاء التمزق في الشبكية من خلال استعمال أشعة ليزر. بعد أن يتم وضع الشبكية في مكانها السليم، سيقوم الجراح بملء فراغ العين بغاز أو زيت سيليكون.

بعد عدة أسابيع من الجراحة، سوف تقوم سوائل العين باستبدال فقاعة الغاز بشكل تدريجي، وسوف تخففي هذه من العين. في جراحات استئصال جل الزجاجية لتصحيح ثقب بقعي أو غشاء فوق الشبكية يتم القيام بتصحيحات مركز الرؤية في نهاية استئصال جل الزجاجية. اليوم يتم القيام بجزء ملحوظ من جراحات استئصال جل الزجاجية بمساعدة جروح وفتحات صغيرة لا تحتاج لخياطة عند الانتهاء، مدة الشفاء والتعافي من الجراحة والشعور بالمضايقة في الأيام الأولى من بعد الجراحة يكون قليلاً جداً.

جزء كبير من هذه الجراحات تتم تحت تخدير موضعي، ولكن في بعض الأحيان، بسبب تعقيد حالة العين أو أن المتعالج لا يتعاون بشكل كامل يتم القيام بتخدير شامل. بعد الجراحة، بالنسبة للمرضى الذين حقن لهم غاز في نهاية الجراحة يوصى بأن يستلقوا على البطن أو على جانب معين في الأيام الأولى من بعد الجراحة. ما سوف يساعد في تحسين نتائج الجراحة.

**يتمنى لكم طاقم القسم النجاح في العملية!**